



ORARI PRELIEVI

MAR · GIO · SAB 7.30 · 9.30

VIA SAN MICHELE, 4 | SACILE (PN)

T **0434 780986** | info@clinicamede.com



IL NUOVO PUNTO PRELIEVI a Sacile

Il tuo nuovo punto prelievi a Sacile

Clinica Mede e Centro di medicina insieme per il nuovissimo Punto Prelievi che garantisce la massima efficienza e sicurezza grazie a personale qualificato e apparecchiature all'avanguardia. Puoi richiedere esami di laboratorio di routine o di alta specializzazione.



COMODO

Il punto prelievi più vicino a casa tua aperto anche il sabato mattina



RAPIDO

Senza tempi di attesa, refertazione veloce, con possibilità di prenotazione



CONVENIENTE

Chiedi il tuo preventivo gratuito



REFERTI ONLINE

Puoi scaricarli dal sito centrodimedicina.com





VIA SAN MICHELE, 4 | SACILE (PN)

info@clinicamede.com

www.clinicamede.it

numero diretto

0434 780 986



Richiedi i nostri esami specifici



A tua disposizione una serie di esami diagnostici non invasivi che permettono di rilevare intolleranze alimentari o la presenza del batterio *Helicobacter pylori*, con un semplice test del respiro.

BREATH TEST HP helicobacter pylori PER L'INDIVIDUAZIONE DI PATOLOGIE GASTRODUODENALI SUPPORTATE DA TALE BATTERIO.

- Diggiuno dalla mezzanotte precedente il prelievo (anche di acqua).
- Il test viene eseguito dopo almeno 10 giorni dal termine della terapia con antibiotici o farmaci (quali gastroprotettori, antiacidi, ...), dall'uso di lassativi o fermenti lattici e da gastrolavaggio intestinale o enteroscopia.

BREATH TEST AB H2-LATTOSIO INDIVIDUA LA CARENZA DELL'ENZIMA LATTASI.

- Il giorno precedente il test, evitare l'assunzione di frutta, verdura, pane, pasta, caramelle, chewing-gum e alcolici.
- La sera precedente si raccomanda una cena leggera.
- Diggiuno da un minimo di 10 ore.
- È possibile bere solo acqua non gasata.
- Non fumare, né dormire, né fare esercizio intenso per almeno mezz'ora prima e durante il test.
- Informare il medico se di recente si è eseguita una terapia antibiotica o si ha avuto episodi di diarrea; questo può avere conseguenze sul risultato del test.
- Non assumere farmaci fin dalla sera precedente.
- Il test deve essere eseguito almeno 4 settimane dopo la terapia con antibiotici, lavaggio intestinale o enteroscopia e almeno 1 settimana dopo la sospensione dell'uso di lassativi o fermenti lattici.

